

Faser Mix

- Stabilisering af afføringen og styrkelse af tarmfloraen gennem kostfibre
- Pektin fungerer som prebiotikum og understøtter den naturlige tarmflora samt regenereringen af tarmens slimhinde
- Den uopløselige fiber cellulose binder overskydende vand i tarmen og regulerer tarmmotiliteten
- Psylliumfrøskaller binder vand og beskytter tarmens slimhinde
- Mannanligosaccharider* (MOS) understøtter væksten af sunde tarmbakterier



* Mannanligosaccharider (MOS) er komplekse kulhydrater, primært bestående af mannose, der findes naturligt i visse planter og gær; de anvendes ofte som kosttilskud i dyrefoder for at fremme sund tarmfunktion og immunforsvar ved at virke præbiotisk og binde patogene bakterier i tarmen.

INDIKATION

- Akutte og kroniske tarminfektioner
- Dysbiose
- Forstoppelse i tarmen
- Akutte og kroniske tilfælde af diarré
- Moderat forstoppelse

MÅL

- Kompensation ved utilstrækkelig fordøjelse
- Aflastning af fordøjelsessystemet
- Regeneration af tarmfloraen

INGREDIENSER

Cellulose, psyllium, pektin (10,0%), solsikkeolie, cikorerod*, gær* (ekstraheret 1,0%; svarende til MOS 0,2%);* tørret

KAN IKKE ANBEFALES TIL:

- Hvalpe og unge hunde op til 6. levemåned
- Graviditet, diegivende

ANVENDELSE OG FODRINGSVARIGHED

LANGSOM OVERGANG:

Overgangen til den angivne daglige ration bør foregå langsomt! En pludselig overgang kan have uønsket indflydelse på dyrenes afføring. Start med små, daglige stigende mængder, indtil den anbefalede daglige ration er nået. Dette muliggør en optimal, gradvis tilpasning af tarmflora og tarmmotilitet til det øgede fiberindhold. Overgangsfasen bør strække sig over en uge. Den anbefalede daglige mængde bør fordeles jævnt over måltiderne. Ved brug af tørfoder anbefales det at blødgøre foderet forud med lunkent vand.

FORUDGÅENDE BLØDLÆGNING AF PULVERET:

Det er vigtigt at blødgøre fibre med lunkent vand, før de gives, og derefter først blande dem i tør- eller vådfoder.

PRÆCIS AFVEJNING:

Administrationen af VET FASER MIX i pulverform muliggør en optimal dosering - selv ved små mængder. Fodermængderne bør nøje afvejes med en vægt.

ANBEFALET MÆNGDE FODER PR. DAG

Vægt kg	Mindste mængde g/24h	Maksimum mængde g/24h	Vand mængde ml
3 - 4	1,5 - 2	3 - 4	20 - 40
5 - 10	2,5 - 5	5 - 10	25 - 100
15 - 20	7,5 - 10	15 - 20	75 - 200
25 - 30	12,5 - 15	25 - 30	125 - 300
30 - 40	15 - 20	30 - 40	150 - 400
50 - 60	25 - 30	50 - 60	250 - 600

ANALYTISKE BESTANDDELE

Vandindhold (%)	4,4
Kulhydrater (NfE) (%)	24,7
Råprotein (%)	2,5
Råfedt (%)	3,9
Råfibre (%)	63,6
Råaske (%)	0,9

En detaljeret samlet analyse findes separat

STR.	VARENUMMER/EAN
150 g	4001967145953